

فعالیت ضداکسیدانی پیتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله عضله کیلکای معمولی (*Clupeonella cultriventris caspia*) با استفاده از عصاره آنزیمی ضمائم پیلوریک

عباس زمانی^{*}^۱، مریم خواجه‌جوی^۲

۱- استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، همدان

۲- دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

دریافت: ۹۴/۱۱/۰۳ پذیرش: ۹۵/۰۳/۲۳

نویسنده مسئول مقاله: a.zamani@malayeru.ac.ir*

چکیده:

اکسیداسیون چربی یکی از فرایندهای اصلی در کاهش کیفیت و ارزش تغذیه‌ای انواع مواد غذایی محسوب می‌شود. هدف از انجام این تحقیق تعیین فعالیت ضداکسیدانی پیتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله عضله کیلکای معمولی (*Clupeonella cultriventris caspia*) بود که با استفاده از آنزیم تریپسین موجود در عصاره استخراج شده ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی تولید شد. بررسی نشان داد دما و pH بهینه فعالیت آنزیم تریپسین برای هیدرولیز سویسترای Na- BAPNA (benzoyl-DL-arginine-ρ-nitroanilide-HCL) به ترتیب ۶۰ درجه سانتی گراد و ۸/۰ بود. فعالیت ضداکسیدانی پیتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله نیز نشان داد که با افزایش درجه هیدرولیز از ۲۰ تا ۴۰ درصد، میزان فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH و ABTS و همچنین قدرت ضداکسیدانی بازدارندگی آهن (FRAP) به طور معناداری افزایش یافت ($p < 0.05$). نتایج پیشنهاد می‌کند آنزیم تریپسین موجود در عصاره استخراج شده ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی می‌تواند ابزار مناسبی برای تولید پیتید از پروتئین ایزوله این گونه با فعالیت ضداکسیدانی محسوب شود و جایگزین مناسبی برای آنزیم‌های تجاری مورد استفاده در تولید پروتئین هیدرولیز شده مانند آنزیم میکروبی باشد.

کلید واژگان: ضداکسیدانی، پروتئین ایزوله، هیدرولیز آنزیمی، *Clupeonella cultriventris caspia*

مقدمه

نامطلوب و بالابودن کیفیت محصول تولیدی است و منابع استفاده شده می‌تواند مواد باقیمانده از فراوری آبزیان یا گونه‌های فاقد ارزش تجاری و خوراکی باشد. معمولاً هضم آنزیمی پروتئین‌ها از طریق شکست پیوندهای پپتیدی با استفاده از آنزیم‌های پروتولیتیک میکروبی (مانند آکالاز، نثوتراز، پروتامکس و....) در صنایع غذایی (Cassia et al., 2000; Kristinsson and Rasco, 2000; Safari et al., 2012; Roslan et al., 2014) اکسیداسیون چربی یکی از فرایندهای اصلی در کاهش کیفیت و ارزش غذایی ای در انواع مواد غذایی محسوب می‌شود و علاوه بر این منجر به تولید محصولات سمی می‌گردد که می‌تواند علت اصلی بروز بیماری‌های مهمی مانند قلبی عروقی، سرطان و اختلالات عصبی و همچنین پیری زودرس به شمار رود (Kinsella, 1987; Kuantaphant et al., 2011) جلوگیری از بروز این مشکلات در اثر اکسیداسیون چربی از طریق تولید رادیکال آزاد، ضد اکسیدان‌های طبیعی و مصنوعی به طور گسترده استفاده می‌شوند به طوری که انواع مصنوعی به دلیل ایجاد سمیت در طولانی مدت، خود به نوعی مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. بنابراین علاقه رو به رشد برای استفاده از ضد اکسیدان‌های طبیعی، بهویژه پپتیدهای مشتق شده از پروتئین هیدرولیز شده مواد غذایی وجود دارد (Tavano, 2013). اما و احشای ماهیان یک منبع بالقوه آنزیمی از جمله پروتئازها است که دارای برخی خواص منحصر به فرد برای کاربردهای صنعتی می‌باشد (Klomklao et al., 2014).

یکی از مهم‌ترین آنزیم‌های پروتئازی موجود در امعا و احشای ماهیان بهویژه ضماین پیلوریک، آنزیم تریپسین (EC 3.4.21.4) است که نقش بسیار مهمی در هیدرولیز پروتئین دارد (Kuantaphant and Benjakul, 2008).

امروزه حجم زیادی از مواد غنی از پروتئین ناشی از فراوری محصولات دریایی بدون بازیابی مناسب به‌طور مستقیم به دریا تخلیه شده و یا برای تولید محصولات با ارزش افزوده پایین در نظر گرفته می‌شود. بازیابی پروتئین‌های موجود در این مواد جنبی و تبدیل آنها به فراورده‌های با ارزش افزوده بالا، مانند پپتیدهای زیست فعال، می‌تواند جایگزین مناسبی تلقی شده و به‌دلیل دارا بودن عملکردهای فیزیولوژیک مانند ضد فشار خون و فعالیت ضد اکسیدانی برای کاربردهای غذایی و دارویی (Naqash and Nazeer, 2010; Roslan et al., 2014; Zamani and Benjakul, 2015) براساس آمار ارائه شده از سوی فائو، میانگین تولید آبزیان در جهان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۴۹ میلیون تن می‌باشد که از این میزان حدود ۹۱ میلیون تن آن متعلق به صید از منابع آبی است که $\frac{29}{5}$ درصد آن به پودر ماهی تبدیل می‌شود (FAO, 2014). احتمالاً بیش از ۵۰ درصد باقیمانده بافت ماهیان به عنوان ضایعات تلقی شده و استفاده بهینه غذایی برای آنها متصور نیست (Kristinsson and Rasco, 2000; Safari et al., 2012). با افزایش چشمگیر جمیعت جهان و محدودیت‌های موجود در صید آبزیان، بدیهی است که استفاده از منابع دریایی باید با پیش‌بینی هوشمندانه تری صورت گیرد. از متداول‌ترین روش‌ها برای بازیابی پروتئین از بقایای مواد حاصل از فراوری ماهی می‌توان به روش‌های شیمیایی و آنزیمی اشاره کرد که امکان تولید طیف گسترده‌ای از مواد غذایی یا فراورده‌های صنعتی با کاربردهای متنوع را فراهم می‌کند. یکی از این روش‌های مؤثر و کارآمد، روش آنزیمی می‌باشد که دارای مزایایی از جمله شرایط ملایم واکنش، پایین بودن میزان محصولات

تا زمان انجام آزمایش‌ها نگهداری شدند (Zamani and Benjakul, 2015) وزن متوسط و طول کل ماهیان به ترتیب $10/5 \pm 1/5$ گرم و $12/45 \pm 0/5$ اسانسی متر بودند.

چربی‌زدایی و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه ضمائم پیلوریک برای مدت ۴ ساعت در دمای یخچال (۴ درجه سانتی‌گراد) قرار گرفت تا از حالت انجماد خارج شود. سپس عمل چربی‌زدایی با استفاده از استون سرد (۲۰-۲۰ درجه سانتی‌گراد) انجام شد که ابتدا نمونه تعیین حجم شده و با استون سرد با نسبت ۱ به ۳ مخلوط گردید و برای مدت ۱ دقیقه عمل یکنواخت‌سازی (Hand Held WT130 homogenizer, Lab Tissue & Cell Tearor, Malaysia) با دستگاه همگن‌ساز (Whatman grade No. 2, Lawrence, USA) حضور یخ انجام شد. سپس نمونه یکنواخت شده با کمک فیلتر شده و مواد باقیمانده روی فیلتر چندین مرتبه با استون سرد شسته شدند و در نهایت مواد روی فیلتر برای مدت یک شب‌انه روز در دمای اتاق قرار گرفتند تا خشک شوند (El-Beltagy et al., 2005). سپس ماده خشک شده با کمک بافر استخراج (50 mM Tris- HCl, pH 7.5, 10mM CaCl₂, 0.5M NaCl) ۵۰ ترکیب شده و برای مدت ۳ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد بر روی همزن مغناطیسی به آرامی مخلوط شدند. سپس مخلوط حاصل شده برای مدت ۴۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در ۱۴۰۰۰ g اسانتریفیوژ گردید (Hermle Z36HK) و سپس محلول رویی به عنوان عصاره خام آنزیمی در نظر گرفته شد (Khantaphant and Benjakul, 2010).

راسب‌سازی با آمونیوم سولفات

Kiloklao et al., 2010) کیلکا ماهیان از مهم‌ترین ماهیان پلاژیک دریای خزر محسوب می‌شوند که در تهیه پودر ماهی استفاده می‌شوند و صید آن در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۳۲۲۱ تن بوده است (Shilat, 2013). کیلکا ماهیان دریای خزر متعلق به جنس Clupeonella بوده و شامل سه گونه کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*), کیلکای آنچوی (*C. grimmi*) و کیلکای چشم درشت (*C. engrauliformis*) می‌باشد که در بین این گونه‌ها، کیلکای معمولی بیش از ۹۰ درصد صید را به خود اختصاص داده است (Karimzadeh et al., 2010). این ماهی همانند سایر ماهیان کوچک پلاژیک دارای فعالیت بالایی از پروتئازها به‌ویژه آنزیم تریپسین در امعا و احشا است و می‌تواند منع خوبی از این آنزیم بوده و بجای آنزیم‌های با منع میکروبی برای تهیه پروتئین هیدرولیز شده با فعالیت ضدآکسیدانی استفاده شود (Kishimura et al., 2005; Castillo-Yanez et al., 2005; Zamani and Benjakul, 2015)

هدف از انجام این مطالعه تهیه عصاره ضمائم پیلوریک از کیلکای معمولی و استفاده از آن برای تهیه پروتئین هیدرولیز شده از عضله این گونه است و سپس فعالیت ضدآکسیدانی پپتیدهای حاصل از پروتئین هیدرولیز شده ارزیابی می‌شود.

مواد و روش‌ها

تهیه نمونه ماهی

ماهی کیلکای معمولی مورد نیاز در این مطالعه از صیدگاه شهرستان بابلسر تهیه گردید. ماهیان پس از صید در داخل یک ظرف یونولیتی با نسبت ۱ به ۲ با یخ مخلوط و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از انتقال ماهیان به آزمایشگاه، ضمائم پیلوریک به عنوان منبع آنزیم تریپسین از ۱۸۰ نمونه در حضور یخ جدا شده و در فریزر -۸۰ درجه سانتی‌گراد

در صدهای مورد آزمایش سنجش گردید. بیشترین فعالیت آنزیم در ۳۰-۶۰ درصد مشاهده شد. در نتیجه این درصد برای تولید پروتئین هیدرولیز شده انتخاب شد.

تعیین دما و pH بهینه فعالیت آنزیم تریپسین

برای تعیین دما و pH بهینه به منظور هیدرولیز پروتئین بهوسیله آنزیم تریپسین، دمای بهینه از طریق مخلوط شدن نمونه آنزیمی با محلول سوبسترا-بافر (۱ میلی مولار ۵۰ mM Tris-HCl, pH 8.0, 10mM BAPNA در بافر CaCl₂) و انکوباسیون به مدت ۲۰ دقیقه در دماهای مختلف شامل ۲۵، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درجه سانتی گراد تعیین گردید. سپس فعالیت آنزیم تریپسین در طول موج and Benjakul, 2010) ۴۰ nm ۴۱۰ nm اندازه گیری شد (Erlanger et al., 1961; Khantaphant بهینه، ابتدا محلول سوبسترا-بافر با pH های مختلف (۱ میلی مولار BAPNA در بافرهای ذکر شده در جدول ۱) تهیه و سپس با نمونه آنزیمی مخلوط گردید و برای ۲۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به حالت انکوباسیون قرار گرفت. سپس فعالیت آنزیم تریپسین در طول موج (Erlanger et al., 1961; ۴۰ nm ۴۱۰ nm Benjakul, 2010)

در این مرحله ابتدا برای حذف برخی پروتئین های غیر ضروری، عصاره خام آنزیمی با کمک آمونیوم سولفات (Sigma, St. Louis, MO, USA) با درصد اشباعیت ۰-۳۰ درصد و ۳۰-۶۰ درصد برای راسپ سازی آنزیم تریپسین مخلوط شد تا بهترین درصد حاوی بیشترین فعالیت آنزیم تریپسین به دست آید. برای این منظور ابتدا آمونیوم سولفات تا حصول اشباعیت ۳۰ درصد در حضور يخ به آرامی به نمونه اضافه شد تا به خوبی حل شود. پس از ۲ ساعت، نمونه در سانتریفیوژ، در ۵ g در دمای ۴ درجه سانتی گراد برای مدت ۴۵ دقیقه قرار گرفت. سپس قسمت رسوب یافته جمع آوری و در ۵ ml بافر استخراج حل شد و محلول رویی نیز مجدد با آمونیوم سولفات تا حصول اشباعیت ۶۰ درصد مخلوط گردید و پس از ۲ ساعت در ۱۴۰۰۰ درجه سانتی گراد برای مدت ۴۵ دقیقه سانتریفیوژ شد. قسمت رسوب یافته جمع آوری و در ۵ ml بافر استخراج حل شد. نمونه حاصل از اشباعیت ۰-۳۰ درصد و ۳۰-۶۰ درصد پس از حل شدن در بافر استخراج در کیسه دیالیز (Sigma, St. Louis, MO, USA) شباهنگ روز در حضور بافر استخراج عمل دیالیز در دمای ۴ درجه سانتی گراد به منظور حذف یون های آمونیوم سولفات انجام شد. سپس فعالیت آنزیم تریپسین در

جدول ۱ انواع بافرهای استفاده شده برای آماده سازی محلول بافر - سوبسترا ۱ میلی مولار BAPNA


۱ ۵۰ mM acetic acid-sodium acetate, pH 4.0-6.0, 10mM CaCl ₂ بافر شماره
۲ ۵۰ mM Tris-HCl, pH 7.0-9.0, 10mM CaCl ₂ بافر شماره
۳ ۵۰ mM Glycine-NaOH, pH 10.0-11.0, 10mM CaCl ₂ بافر شماره

benzoyl-DL-arginine- ρ -nitroanilide-HCL (در بافر ۱۵۰ mM Tris-HCl, pH 8.0, 10mM CaCl₂) استفاده گردید و قرائت نوری در طول موج ۴۱۰ nm انجام شد. برای

سنجش فعالیت آنزیم تریپسین و پروتئین محلول برای سنجش فعالیت آنزیم تریپسین از روش Erlanger و همکاران (۱۹۶۱) و از سوبسترا ۱ (BAPNA Na-)

ml ۱ به عنوان استاندارد استفاده شد و قرائت نوری نمونه‌ها در nm ۷۵۰ انجام شد (شکل ۱).

سنجهش میزان پروتئین محلول در نمونه‌ها از جمله نمونه هیدرولیز شده از روش Lowry و همکاران (۱۹۵۱) استفاده گردید. در این روش از آلبومین سرم گاوی با غلظت / mg



شکل ۱ منحنی استاندارد BSA (محور X: BSA / ۱۰۰ μl، محور Y: جذب نوری).

پروتئین ۲ در صد مخلوط گردید. سپس برای مدت ۱ دقیقه با کمک دستگاه همگن‌ساز، عمل همگن‌سازی انجام شد و عمل انکوباسیون مخلوط حاصل شده برای مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد. واکنش هیدرولیز با اضافه کردن عصاره ضمایم پیلوویریک حاوی ۴/۵، ۲/۵ و ۶/۵ واحد فعالیت آنزیم تریپیسین (IU)، نسبت به گرم پروتئین ایزوله تا حصول تقریبی درجه هیدرولیز ۳۰، ۲۰ و ۴۰ درصد انجام شد (Benjakul and Morrissey, 1997).

پس از گذشت ۱۲۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد، ۱ میلی‌لیتر از مخلوط هیدرولیز شده با ۱ میلی‌لیتر SDS در صد (دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد) ترکیب شده و برای مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد به منظور غیرفعال کردن آنزیم تریپیسین حرارت داده شد. سپس مخلوط برای مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در ۲۰۰۰g سانتریفیوژ گردید و مایع رویی به دست آمده به عنوان پروتئین هیدرولیز شده در نظر گرفته شد و برای تعیین فعالیت ضداکسیدانی استفاده شد.

تولید پروتئین ایزوله و پروتئین هیدرولیز شده برای تولید پروتئین ایزوله و پروتئین هیدرولیز شده از روش Rawdkuen و همکاران (۲۰۰۹) استفاده گردید. عضله ماهی کیلکا پس از جداسازی با کمک دست، با استفاده از چاقو به قطعات کوچک تبدیل شد و با آب مقطر سرد (۱:۹) مخلوط شده و برای مدت ۱ دقیقه با دستگاه همگن‌ساز عمل همگن‌سازی صورت گرفت. سپس مخلوط به دست آمده در pH ۱۱/۲ تنظیم شده و برای مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در ۵۰۰۰g سانتریفیوژ گردید و محل رویی حاصل شده جمع‌آوری و در pH ۵/۵ تنظیم گردید و عمل سانتریفیوژ برای مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در ۵۰۰۰g انجام شد. ماده رسوب یافته به عنوان «پروتئین ایزوله» در نظر گرفته شد و میزان پروتئین آن با روش کجلدل (AOAC, 2000) سنجش شد که مقدار آن معادل ۹۵/۱۴ درصد بود.

برای آماده‌سازی پروتئین هیدرولیز شده، پروتئین ایزوله با بافر pH 8.0, mM Tris-HCl ۵۰ تا حصول غلظت

(acid) ۷/۴ میلی مولار استفاده شد و جذب نمونه در طول موج ۷۳۴ نانومتر قرائت شد.

- قدرت ضد اکسیدانی احیا کنندگی آهن (FRAP) برای تعیین قدرت ضد اکسیدانی احیا کنندگی آهن از روش Benzie و Strain (۱۹۹۶) استفاده گردید. در این

روش از TPTZ

(2,4,6-tripyridyltriazine) با غلظت ۱۰ میلی مولار استفاده شد و جذب نمونه در طول موج ۵۹۳ نانومتر قرائت گردید.

برای تعیین مقدار فعالیت ضد اکسیدانی ناشی از سنجش های فوق از منحنی استاندارد Trolox استفاده شد و مقادیر به صورت میکرومول Trolox در گرم پروتئین بیان گردید. غلظت پروتئین محلول برای سنجش فعالیت ضد اکسیدانی ۲/۵ میلی گرم در میلی لیتر در نظر گرفته شد.

آنالیز آماری

برای مقایسه فعالیت ضد اکسیدانی بین درجات مختلف هیدرولیز پروتئین ایزوله و همچنین رسم نمودارها از نرم افزارهای 21 SPSS و Excel استفاده شد. برای تعیین معنادار بودن اختلاف از تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید و سپس میانگین ها با آزمون دانکن در سطح ۵ درصد مقایسه شدند. تمام ارزیابی ها نیز در ۳ تکرار انجام گرفت.

نتایج

دما و pH بهینه فعالیت آنزیم تریپسین

نتایج حاصل از بررسی دمای بهینه آنزیم تریپسین ماهی کیلکای معمولی در شکل ۲ نشان داده شده است. نتایج نشان داد دمای بهینه فعالیت آنزیم تریپسین عصاره ضمائم پیلوریک برابر با ۶۰ درجه سانتی گراد بود، به طوری که با افزایش دما از ۲۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد، فعالیت آنزیم افزایش یافت و در ۶۰ درجه سانتی گراد به حداقل خود

تعیین درجه هیدرولیز

برای تعیین درجه هیدرولیز از روش Benjakul و Morrissey (۱۹۹۷) استفاده گردید. نمونه هیدرولیز شده با بافر فسفات ۰/۲ مولار pH ۸/۲ و محلول ۰/۰۱ درصد 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) مخلوط شده و در حمام آب در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد برای ۳۰ دقیقه در تاریکی قرار گرفت. برای توقف واکنش از محلول ۰/۱ مولار سولفات سدیم استفاده گردید. سپس مخلوط واکنش برای مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق خنک گردید و قرائت نوری نمونه در ۴۲۰ نانومتر انجام شد و محتویات اسید آمینه از طریق منحنی استاندارد متعلق به اسید آمینه لوسین (غلظت ۰ تا ۵ میلی مولار) تعیین شد و درجه هیدرولیز نیز از فرمول زیر محاسبه گردید:

$$\text{DH} (\%) = \frac{[L_t - L_0]}{[L_{\max} - L_0]} \times 100$$

L_t = مقدار اسید آمینه رهاسازی شده در زمان ۱۲۰ دقیقه.
 L_0 = مقدار اسید آمینه در محلول پروتئین ایزوله اولیه.
 L_{\max} = مقدار کل اسید آمینه در محلول پروتئین ایزوله اولیه پس از هیدرولیز در HCl ۶ مولار در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد برای ۲۴ ساعت.


تعیین فعالیت ضد اکسیدانی نمونه هیدرولیز شده

- فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH برای تعیین فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH از روش Binsan و همکاران (۲۰۰۸) استفاده گردید. در این (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) روش از DPPH ۰/۱۵ میلی مولار استفاده شد و جذب نمونه در طول موج ۵۱۷ نانومتر قرائت شد.


- فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS برای تعیین فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS از روش Binsan و همکاران (۲۰۰۸) استفاده گردید. در این روش 2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) ABTS

شده است. pH بهینه فعالیت آنزیم تریپسین برابر ۸/۰ بود و با افزایش pH از ۴/۰ تا ۸/۰، فعالیت آن افزایش و از pH ۸/۰ تا ۱۱/۰ فعالیت کاهش یافت.

رسید، اما از ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد یک کاهش ناگهانی در فعالیت آنزیم مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی pH بهینه بر فعالیت آنزیم تریپسین نیز در شکل ۳ نشان داده



شکل ۲ تأثیر دما بر فعالیت آنزیم تریپسین کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*)



شکل ۳ تأثیر pH بر فعالیت آنزیم تریپسین کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*)


درجات هیدرولیز به طور معناداری بالاترین فعالیت کاهنده‌گی DPPH را داشت ($p < 0.05$). براساس شکل ۵ نتایج حاصل از بررسی فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS نشان داد با افزایش درجه هیدرولیز از ۲۰ تا ۴۰ درصد، فعالیت بازدارندگی درجه هیدرولیز ۴۰ درصد نسبت به درجات هیدرولیز دیگر با افزایش معناداری همراه بود و درجه هیدرولیز ۴۰ درصد بالاترین فعالیت بازدارندگی

تعیین درجه هیدرولیز

نتایج حاصل از فعالیت ضد اکسیدانی پپتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله عضله کیلکای معمولی در شکل‌های ۴ تا ۶ نشان داده شده است. همان‌گونه که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، با افزایش درجه هیدرولیز از ۲۰ تا ۴۰ درصد فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH افزایش یافت به طوری که درجه هیدرولیز ۴۰ درصد، نسبت به سایر


هیدرولیز ۴۰ درصد نسبت به ۲۰ و ۳۰ درصد به طور معناداری بالاترین قدرت ضد اکسیدانی احیا کنندگی آهن را داشت ($p < 0.05$) (شکل ۶).

رادیکال ABTS را نشان داد ($p < 0.05$). قدرت ضد اکسیدانی احیا کنندگی آهن نیز با افزایش درجه هیدرولیز از ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافت و درجه




شکل ۴ تأثیر درصد مختلف هیدرولیز پروتئین ایزوله حاصل از عضله کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*)

بر فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH. حروف کوچک غیر مشترک بیانگر اختلاف معنادار است ($Mn \pm SD$, $n = 3$, $\alpha = 0.05$).



شکل ۵ تأثیر درصد مختلف هیدرولیز پروتئین ایزوله حاصل از عضله کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*)

بر فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS. حروف کوچک غیر مشترک بیانگر اختلاف معنادار است ($Mn \pm SD$, $n = 3$, $\alpha = 0.05$).



شکل ۶ تأثیر درصد مختلف هیدرولیز پروتئین ایزوله حاصل از عضله کیلکای معمولی (*C. cultriventris caspia*)

بر میزان قادرت ضد اکسیدانی احیاکنندگی آهن. حروف کوچک غیرمشترک بیانگر اختلاف معنادار اسا ($Mn \pm SD$, $n = 3$, $a = 0/05$)

(Khangphant et al., 2011; Klomklao et al., 2013;
Zamani and Benjakul, 2015)

فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH عضله ماهی کیلکای معمولی نشان داد که با افزایش درجه هیدرولیز به طور معناداری افزایش یافت. Nakajima و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که هیدرولیز عضله ماهی آزاد اقیانوس اطلس (*Salmo salar*) و ماهی آزاد کوهو (*Oncorhynchus kisutch*) با استفاده از آنزیم پانکرآتین باعث افزایش فعالیت کاهندگی DPPH گردید، اما اختلاف معناداری را نشان نداد. DPPH یک رادیکال به نسبت پایدار نیتروژن آلی است و اغلب به عنوان نخستین روش ارزیابی مهار رادیکال آزاد در جذب پیشینه ۵۱۷ نانومتر استفاده می‌شود. زمانی که DPPH با یک ماده دهنده پروتون مانند یک ضد اکسیدان مواجه می‌شود، رادیکال مهار شده و جذب واکنش کاهش می‌یابد و کاهش در جذب نیز نشانه فعالیت مهارکنندگی رادیکال می‌باشد. (Barkia et al., 2010) (Bougatef et al., 2010) تأثیر عصاره امعا و احشای ماهی همکاران (۲۰۱۰) تأثیر عصاره امعا و احشای ماهی *Sardinella aurita* را بر فعالیت DPPH پروتئین هیدرولیز شده همین گونه بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که فعالیت DPPH افزایش یافت. نتایج مطالعه Nalinanon و همکاران (۲۰۱۱) بر روی تأثیر آنزیم پروتئاز امعا و احشای

تакنون از قسمت‌های مختلف بدن گونه‌های مختلف ماهیان، پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آنزیمهای میکروبی تولید شده است که دارای پپتیدهای با خواص ضد اکسیدانی می‌باشند (Thiansilakul et al., 2007; Klompong et al., 2008; Khantaphant et al., 2011; Roslan et al., 2014; Liu et al., 2014; Silva et al., 2014; Chi et al., 2015). عضله ماهی ترکیب اسید آمینه‌ای بسیار مناسبی دارد و منبع عالی از پروتئین‌های مغذی با قابلیت هضم بالا می‌باشد. با این حال، بسیاری از گونه‌های ماهیان به دلیل دارا بودن قابلیت بالای فساد و دیگر مشکلات ذاتی مربوط به بوی نامطلوب، بافت و طعم کمتر استفاده می‌شوند. پروتئین‌های عضله گونه‌های مختلف ماهیان برای تولید پروتئین هیدرولیز شده با فعالیت آنتی اکسیدانی مختلف با موفقیت بررسی شده‌اند (Bougatef et al., 2009; Hsu, 2010; Klompong et al., 2008; Nakajima et al., 2009; Nalinanon et al., 2011; (Naqash and Nazeer, 2011; Raghavan and Kristinsson, 2008; Rajaram and Nazeer, 2010

در زمینه استفاده از آنزیمهای عصاره ضمایم پیلوویک یا امعا و احشای ماهی برای تولید پروتئین هیدرولیز شده از ماهیان مطالعات بسیار اندکی انجام شده است

و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک *Priacanthus macracanthus* بر میزان هیدرولیز ژلاتین پوست همین گونه را بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد افزایش هیدرولیز تا ۱۵ درصد باعث افزایش فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS گردید اما اختلاف معناداری نداشت. روش ارزیابی ABTS ابزار بسیار مناسبی برای تعیین فعالیت ضداسیدانی بوده که در آن رادیکال به صورت ترکیب غیرفعال رادیکال - ABTS تبدیل می‌شود. به طور کلی، تمام ترکیبات هیدرولیز شده حاوی پپتید یا پروتئین که اهدافندهای هیدرولیز هستند، می‌توانند با رادیکال واکنش نشان دهند و آنها را به محصولات با ثبات تر تبدیل کرده و در نتیجه واکنش‌های زنجیره‌ای رادیکال را حذف کنند.

قدرت ضداسیدانی احیاکنندگی آهن پپتید حاصل از هیدرولیز عضله ماهی کیلکای معمولی نشان داد با افزایش درجه هیدرولیز از ۲۰ تا ۴۰ درصد به طور معناداری افزایش یافت. Phanturat و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک *Priacanthus macracanthus* بر میزان هیدرولیز ژلاتین پوست همین گونه را بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد افزایش هیدرولیز تا ۱۵ درصد باعث افزایش ضداسیدانی احیاکنندگی آهن گردید اما اختلاف معناداری نداشت. نتایج حاصل از مطالعه Khantaphant و همکاران (۲۰۱۱) بر روی تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک بر میزان *Lutjanus vitta* هیدرولیز پروتئین عضله ماهی نشان داد که با افزایش درجه، هیدرولیز آهن پپتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله به طور معناداری افزایش می‌یابد. پروتئین هیدرولیز (*Misgurnus anguillicaudatus*) شده حاصل از ماهی کلمه (You et al., 2009) (*Selaroides leptolepis*) نیز (Klompong et al., 2008) دارای فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS بودند. Nalinanong و همکاران (۲۰۱۱) تأثیر آنزیم پروتئاز امعا و احسای ماهی *Katsuwonus pelamis* بر هیدرولیز عضله گونه *Nemipterus hexodon* بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که افزایش درجه هیدرولیز تا ۲۰ درصد افزایش معناداری بر فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH داشتند. تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک *Priacanthus macracanthus* بر میزان هیدرولیز ژلاتین پوست همین گونه نشان داد، افزایش هیدرولیز تا ۱۵ درصد باعث افزایش معناداری در فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH گردید (Phanturat و همکاران، ۲۰۱۰).

نتایج مطالعه Khantaphant و همکاران (۲۰۱۱) روی تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک بر میزان هیدرولیز پروتئین عضله ماهی *Lutjanus vitta* نشان داد که با افزایش درجه هیدرولیز، فعالیت ضداسیدانی پپتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله افزایش می‌یابد.

فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS عضله ماهی کیلکای معمولی نشان داد که با افزایش درجه هیدرولیز به طور معناداری افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعه Khantaphant و همکاران (۲۰۱۱) روی تأثیر عصاره ضمائم پیلوریک بر میزان هیدرولیز پروتئین عضله ماهی *Lutjanus vitta* نشان داد که با افزایش درجه، هیدرولیز فعالیت ضداسیدانی پپتید حاصل از هیدرولیز پروتئین ایزوله به طور معناداری افزایش می‌یابد. پروتئین هیدرولیز (*Misgurnus anguillicaudatus*) شده حاصل از ماهی کلمه (You et al., 2009) (*Selaroides leptolepis*) (Klompong et al., 2008) دارای فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS بودند. Nalinanong و همکاران (۲۰۱۱) تأثیر آنزیم پروتئاز امعا و احسای ماهی *Katsuwonus pelamis* بر هیدرولیز عضله گونه *Nemipterus hexodon* بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد که افزایش درجه هیدرولیز تا ۲۰ درصد افزایش معناداری بر فعالیت بازدارندگی رادیکال ABTS داشتند.

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند آنزیم تریپسین موجود در عصاره استخراج شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی، می‌تواند ابزار مناسبی برای تولید پپتید از پروتئین ایزووله این گونه با فعالیت ضد اکسیدانی باشد، همچنین می‌تواند برای آنزیم‌های تجاری مورد استفاده در تولید پروتئین هیدرولیز شده مانند آنزیم میکروبی و پپتید حاصل شده برای ضد اکسیدان‌های شیمیایی جایگزین مناسبی باشد.

منابع

AOAC, Official Methods of Analysis, 17th edition., 2000. Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD.

Barkia, A., Bougatef, A., Khaled , H.B. and Nasri, M, 2010. Antioxidant activities of sardinelle heads and/or Viscera protein hydrolysates prepared by Enzymatic treatment. *Journal of Food Biochemistry*.34: 303–320.

Benjakul, S. and Morrissey, M, 1997. Protein hydrolysates from Pacific whiting solid wastes. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 45:3423–3430.

Benzie, I.F.F. and Strain, J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ‘antioxidant power’: the FRAP assay. *Analytical Biochemistry*. 239:70–76.

Binsan, W., Benjakul, S., Visessanguan, W., Roytrakul, S., Tanaka, M and Kishimura, H, 2008. Antioxidative activity of Mungoong, an extract paste, from the cephalothorax of white shrimp (*Litopenaeus vannamei*). *Food Chemistry*.106:185–193.

Bougatef, A., Hajji, M., Balti, R., Lassoued, I., Triki-Elouz, Y., and Nasri, M, 2009. Antioxidant and free radical-scavenging activities of smooth hound (*Mustelus mustelus*) muscle protein hydrolysates obtained by gastrointestinal proteases. *Food Chemistry*.114:1198–1205.

Bougatef, A., Nedjar-Arroume,N., Manni, L., Ravallec, R., Barkia, A., Guillochon,D. and Nasri,

رادیکال آزاد را نشان می‌دهد و از گسترش اکسیداسیون چربی جلوگیری می‌کند یا آنرا به تعویق می‌اندازد. در حال حاضر، تحقیقات زیادی در زمینه پپتیدهای ضد اکسیدان مشتق شده از منابع غذایی گزارش شده و درباره رابطه بین ساختار و تأثیرگذاری پپتیدها نیز بحث شده است. پپتیدها فعالیت ضد اکسیدانی مختلفی بسته به اندازه مولکولی، ترکیب اسید آمینه و توالی آن نشان می‌دهند (Samaranayaka and Li-Chan, 2011). تاکنون سازوکار دقیق عملکرد پپتیدها به عنوان ضد اکسیدان مشخص نشده است اما بعضی از اسید آمینه‌های موجود در پپتیدها نقش مهمی در این زمینه دارند که می‌توان به هیستیدین، متیونین، سیستئین، والین، لوسمین، ایزولوسین و پرولین اشاره کرد که فعالیت بالایی نسبت به اسیدهای چرب چند غیر اشباع داشته و می‌توانند تأثیر مهمی در حذف رادیکال‌های آزاد در مواد غذایی پر چرب داشته باشند. اسید آمینه‌های آروماتیک مانند تیروزین، فنیل آلانین و تریپتوفان به دلیل دارا بودن حلقه آروماتیک، توانایی اهدای پروتون به رادیکال‌های الکترونی مؤثر در ساخت گونه‌های اکسیژنی فعال و پایدار در فرایند حذف رادیکال را دارند (Sarmadi and Ismail, 2010). رادیکال‌های آزاد، به ویژه گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و گونه‌های نیتروژن فعال (RNS)، در بروز بیماری‌های مزمن و تحلیل‌کننده شدید مانند التهاب، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های عصبی، سرطان و اختلالات مربوط به پیری نقش دارند. اگرچه ROS و RNS پیامبران ثانویه در عملکردهای فیزیولوژیکی طبیعی موجودات هستند و در سازوکارهای اکسایش و کاهش مختلف شرکت دارند، تولید بیش از حد این گونه‌ها می‌تواند فعالیت آنزیم‌های محافظتی را مختل کند و باعث آثار مخرب و کشنده سلولی شود (Locatelli et al., 2009).

- Kinsella JE. Seafood and fish oils in human diseases. New York, USA: Marcel Dekker; 1987.
- Kishimura,H., Hayashi, K., Myashita,Y. and Nonmi, Y., 2005.** Characterization of two trypsin isozymes from the viscera of Japanase Anchovy (*Engraulisjaponica*). *Journal of Food Biochemistry*. 29: 459-469.
- Klomklao, S., Kishimura, H. and Benjakul, S., 2013.** Use of viscera extract from hybrid catfish (*Clarias macrocephalus* × *Clarias gariepinus*) for the production of protein hydrolysate from toothed ponyfish (*Gazza minuta*) muscle. *Food Chemistry*. 136:1006–1012.
- Klomklao, S., Kishimura, H. and Benjakul, S., 2014.** Anionic trypsin from the pyloric ceca of Pacific saury (*Cololabis saira*): purification and biochemical characteristics. *Journal of Aquatic Food Product Technology*. 23:186–200.
- Klomklao, S., Kishimura, H., Benjakul, S., Simpson, B.K., and Visessanguan, W., 2010.** Cationic trypsin: A predominant protease in Pacific saury (*Cololabias saira*) pyloric caeca. *Journal of Food Biochemistry*. 34:1105–1123.
- Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D., Hayes, K. D., and Shahidi, F., 2008.** Comparative study on antioxidative activity of yellow stripe trevally protein hydrolysate produced from Alcalase and Flavourzyme. *International Journal of Food Science and Technology*. 43: 1019-1026.
- Kristinsson, H. G., and Rasco, B. A., 2000.** Fish protein hydrolysates:Production, biochemical, and functional properties. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 40(1): 43–81.
- Liu,Y., Li , X., Chen,Z., Yu, J., Wang, F., and Wang, J., 2014.** Characterization of structural and functional properties of fish protein hydrolysates from surimi processing by-products. *Food Chemistry*. 151: 459–465.
- Locatelli,M., Gindro,R., Travaglia,F., Coïsson,J., Rinaldi,M., Arlorio, M., 2009.** Study of the DPPH-scavenging activity: Development of free software for the correct interpretation of data. *Food Chemistry*.114: 889–897.
- Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L., and Randall, R. J., 1951.** Protein measurement with the folin phenol reagent. *The Journal of Biological Chemistry*. 193: 265–275.
- M., 2010.** Purification and identification of novel antioxidant peptides from enzymatic hydrolysates of sardinelle (*Sardinella aurita*) by-products proteins. *Food Chemistry*. 118: 559–565.
- Cassia, R. O., Martone, C. B., and Sanchez, J. J., 2000.** Characterization of fish protein hydrolysates obtained by enzymatic autolysis. *Latin American Applied Research*. 30: 241–244.
- Castillo-Yanez, F., Pacheco-Aguilar, R., Garcia-Carreno, F. and Toro, M., 2005.** Isolation and characterization of trypsin from pyloric caeca of Monterey sardine, *Sardinops sagax caerulea*. *Comparative Biochemistry and physiology*.140B: 91-98.
- Chi, C.F.,Wang, B., Hu, F.Y., Wang, Y.M., Bin Zhang, B., Deng, S.G., and Wu, C.W., 2015.** Purification and identification of three novel antioxidant peptides from protein hydrolysate of bluefin leatherjacket (*Navodon septentrionalis*) skin. *Food Research International*. 73:124–129.
- Erlanger, B., Kokowsky, N. and Cohen,W., 1961.** The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. *Archives of Biochemistry and Biophysics*. 95: 271-278.
- FAO, 2014.** The state of world fisheries and aquaculture. In: FAO - Fisheries and Aquaculture Department, Food and Agriculture Organization of United Nations.
- Hsu, K., 2010.** Purification of antioxidative peptides prepared from enzymatic hydrolysates of tuna dark muscle by-product. *Food Chemistry*.122: 42–48.
- Karimzadeh G., Gabrielyan B. and Fazli H., 2010.** Population dynamics and biological characteristics of kilka species (Pisces: Clupeidae) in the southeastern coast of the Caspian Sea. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*. 9(3):422-433.
- Khantaphant, S. and Benjakul, S., 2008.** Comparative study on the protease from fish pyloric caeca and the use for production of gelatine hydrolasste with antioxidative activity, Comparative Physiology and Biochemistry. 151B: 410-419.
- Khantaphant, S., Benjakul, S., and Kishimura, H., 2011.** Antioxidative and ACE inhibitory activities of protein hydrolysates from the muscle of brownstripe red snapper prepared using pyloric caeca and commercial proteases. *Process Biochemistry*.46 :318–327.

- Roslan, J., Yunos, F.Md., Abdullah, N., and Kamal, S.MM., 2014.** Characterization of Fish Protein Hydrolysate from Tilapia (*Oreochromis niloticus*) by-Product. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*. 2: 312 – 319.
- Safari, R., Motamedzadegan , A., Ovissipour, M., Regenstein, J.M., Asbjorn Gildberg, A., and Rasco, B., 2012.** Use of Hydrolysates from Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*) Heads as a Complex Nitrogen Source for Lactic Acid Bacteria. *Food and Bioprocess Technology*. 5:73–79.
- Samaranayaka, A. G. P., and Li-Chan, E. C. Y., 2011.** Food-derived peptidic antioxidants: A review of their production, assessment, and potential applications. *Journal of Functional Foods*. 3(4): 229–254.
- Sarmadi, B. H., and Ismail, A., 2010.** Antioxidative peptides from food proteins: A review. *Peptides*. 31(10):1949–1956.
- Shilat., 2013.** Iranian Fisheries Organization. Annual Report. 64 p (in Persian).
- Silva, J.F.X., Ribeiro, K., Silva, J.F., Cahú, T.B., and Bezerra, R.S., 2014.** Utilization of tilapia processing waste for the production of fish protein hydrolysate. *Animal Feed Science and Technology*. 196: 96–106.
- Tavano, O. L., 2013.** Protein hydrolysis using proteases: An important tool for food biotechnology. *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*. 90:1–11.
- Thiansilakul, Y., Benjakul, S., and Shahidi, F., 2007.** Antioxidative activity of protein hydrolysate from round scad muscle using Alcalase and Flavourzyme. *Journal of Food Biochemistry*. 31: 266-287.
- You, L., Zhao, M., Cui, C., Zhao, H., and Yang, B., 2009.** Effect of degree of hydrolysis on the antioxidant activity of loach (*Misgurnus anguillicaudatus*) protein hydrolysates. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*. 10: 235–240.
- Zamani, A. and Benjakul, S., 2016.** Trypsin from unicorn leatherjacket (*Aluterus monoceros*) pyloric caeca: Purification and its use for preparation of fish protein hydrolysate with antioxidative activity . *Journal of the Science of Food and Agriculture*.
- Mullally, M. M., O'Callaghan, D. M., FitzGerald, R. J., Donnelly, W. J., and Dalton, J. P., 1994.** Proteolytic and peptidolytic activities in commercial pancreatin protease preparations and their relationship to some whey protein hydrolysate characteristics. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 42 (12): 2973–2981.
- Nakajima, K., Yoshie-Stark, Y., and Ogushi, M., 2009.** Comparison of ACE inhibitory and DPPH radical scavenging activities of fish muscle hydrolysates. *Food Chemistry*. 114: 844–851.
- Nalinanon, S., Benjakul, S., Kishimura, H., and Shahidi, F., 2011.** Functionalities and antioxidant properties of protein hydrolysates from the muscle of ornate threadfin bream treated with pepsin from skipjack tuna. *Food Chemistry*. 124: 1354–1362.
- Naqash, S., Y., and Nazeer, R. A., 2010.** Antioxidant Activity of Hydrolysates and Peptide Fractions of *Nemipterus japonicus* and *Exocoetus volitans* Muscle. *Journal of Aquatic Food Product Technology*. 19:180–192.
- Naqash, S. Y., and Nazeer, R. A., 2013.** Antioxidant and functional properties of protein hydrolysates from pink perch (*Nemipterus japonicus*) muscle. *Journal of Food Science and Technology*. 50(5): 972-978.
- Phanturat, P., Benjakul, S., Visessanguan, W., and Roytrakul, S., 2010.** Use of pyloric caeca extract from bigeye snapper (*Priacanthus macracanthus*) for the production of gelatin hydrolysate with antioxidative activity. *LWT – Food Science and Technology*. 43:86–97.
- Raghavan, S., and Kristinsson, H. G., 2008.** Antioxidative efficacy of alkali-treated Tilapia protein hydrolysates: A comparative study of five enzymes. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 56:1434–1441.
- Rajaram, D., and Nazeer, R. A., 2010.** Antioxidant properties of protein hydrolysates obtained from marine fishes *Lepturacanthus savala* and *Sphyraena barracuda*. *International Journal of Biotechnology and Biochemistry*. 6: 435–444.
- Rawdkuen, S., Sai-Ut, S., Khamsorn, S., Chaijan, M. and Benjakul, S., 2009.** Biochemical and gelling properties of tilapia surimi and protein recovered using an acid-alkaline process. *Food Chemistry*.112:112–119.



Antioxidative activity of peptide from protein isolate hydrolysate from common kilka (*Clupeonella cultriventris caspia*) muscle using pyloric caeca enzyme extraction

Abbas Zamani ^{1*}, Maryam Khajavi ²

1- Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Hamedan, Iran.

2- Ph.D Student, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran.

Received: 23.01.2016

Accepted: 12.06.2016

*Corresponding author: a.zamani@malayeru.ac.ir

Abstract:

Lipid oxidation is one of the major processes in deterioration of food quality and nutritional value. In this study, antioxidative activity of peptide was determined from hydrolysate of protein isolate from common kilka (*Clupeonella cultriventris caspia*) muscle using trypsin enzyme of pyloric caeca extraction. The optimum pH and temperature of trypsin enzyme for BAPNA (N_α-benzoyl-DL- argentine - ρ-nitroanilide -HCL) hydrolysis were measured 8.0 and 60 °C, respectively. The finding showed that antioxidative activities determined by DPPH, ABTS radical scavenging activities and ferric reducing antioxidant power (FRAP) increased significantly with variation of degree of hydrolysates from 20 to 40% (p<0.05). The results suggest that trypsin enzyme from pyloric caeca extraction could be a useful tool for peptide production from protein isolate with antioxidant activity and used as an alternative for commercial enzymes such as microbial enzymes in production of protein hydrolysates.

Keywords: Antioxidative, Protein isolate, Enzymatic hydrolysis, *Clupeonella cultriventris caspia*