

مقایسه برخی از فاکتورهای خونشناسی، بیوشیمیایی و هورمونی سرم خون مولدین نر و ماده ماهی (*Cyprinus carpio*)

*مجید محمدزاد

۱- گروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی، شاخصهای ارزشمندی برای پایش سلامتی ماهی و پاسخهای فیزیولوژیک، وضعیت تغذیه و شرایط محیطی موثر بر سلامت ماهی است. در این بررسی، مقایسه شاخصهای خونشناسی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی سرم خون مولدین نر و ماده ماهی کپور دریایی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور خونگیری از دو گروه مولدین نر و ماده به تعداد ۱۴ قطعه ماهی از هر گروه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این مطالعه در مورد فاکتورهای خونشناسی نشان داد که از لحاظ تعداد گلوبولهای قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلوبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولی (MCH)، میزان غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولهای قرمز (MCHC)، تعداد گلوبولهای سفید (WBC)، مونوپلیت و گرانولیست اختلاف معنی دار آماری در دو جنس نر و ماده وجود ندارد ($P > 0.05$). نتایج این بررسی نشان داد از لحاظ میزان گلوکز، کلسیم و کورتیزول در بین دو جنس نر و ماده کپور دریایی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوريکه میزان گلوکز و کلسیم در جنس نر و میزان کلسیم و هورمون کورتیزول در جنس ماده بیشتر بود. ضمن اینکه از لحاظ مقدار تری گلیسرید، توتال پروتئین، آلبومین، سدیم و پتاسیم در بین دو جنس نر و ماده کپور دریایی اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد ($P > 0.05$). نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که جنسیت ماهی کپور دریایی در زمان بلوغ بر شاخصهای خونشناسی ماهی تاثیری ندارد اما می تواند بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریایی مانند گلوکز، کلسیم و هورمون کورتیزول تاثیر گذار باشد.

کلید واژه‌ها: فاکتورهای خونشناسی، جنسیت، کورتیزول، ماهی کپور دریایی

مقدمه

ماهی کپور دریایی (*Cyprinus carpio*) از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) بزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین است که در دریای خزر زیست می کند و در ناحیه مصبی و آبهای لب شور نیز دیده می شوند و همچنین یکی از با ارزش ترین گونه های آبزی اقتصادی دریایی خزر است. این ماهی در محیط طبیعی در آبهای ساکن و یا آبهای تقریباً ساکن با سرعت ناچیز که پوشیده از گیاهان آبزی و دارای بستر نرم است زندگی کرده و غالباً به همراه ماهیان برکه ای (*Carassius carassius*) دیده می شود^[۱]. گوشت ماهی کپور به جهت طعم خوبی که دارد، در بین جمعیت کثیری از مردم ایران بالاخص ساکنین نواحی شمال کشور (به ویژه استانهای گلستان و مازندران) از مقبولیت خاصی برخوردار است^[۲]. خون به عنوان یک بافت سیال و سهل الوصول یکی از مهمترین مایعات زیستی بدن بوده که تحت تاثیر حالات مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر می گردد^[۳-۴]. خون شناسی یکی از شاخه های مهم پزشکی و دامپزشکی است که نقش آن در تشخیص

اختلالات و بیماریها دارای اهمیت فراوانی می‌باشد^[۵-۷]. پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیابی، شاخص‌های ارزشمندی برای پایش سلامتی ماهی و پاسخ‌های فیزیولوژیک، وضعیت تغذیه و شرایط محیطی موثر بر سلامت ماهی است^[۸]. از این رو، باید مطالعات بیشتری در ارتباط با پارامترهای خونی، چگونگی آنها در شرایط مختلف فیزیولوژیک و پاتوبیولوژیک صورت گیرد تا به موازات گسترش آنها بتوان پاسخگوی نیازهای علمی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری باشد^[۹]. تاکنون مطالعات زیادی در خصوص موضوعات مختلف بر روی شاخصهای خونی ماهی کپوردریابی صورت پذیرفته است از جمله تاثیر دفعات و درصد غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیابی سرم خون بچه ماهی کپور^[۱۰]. تعیین برخی از فاکتورهای خونی و آنزیمی سرم خون ماهی کپور^[۱۱]، اندازه گیری برخی پارامترهای بیوشیمیابی سرم خون بچه ماهی کپور^[۱۲]، بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیابی سرم خون ماهی کپوردریابی خزر^[۱۳] و بررسی اثر دوره‌های گرسنگی و رشد جبرانی برروی برخی از فاکتورهای بیوشیمیابی سرم خون بچه ماهی کپور^[۱۴]. پارامترهای هماتولوژیک در ماهیان ممکن است تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیک مانند جنسیت، مراحل تولید مثل، سن، اندازه و سلامتی آنها تعییر کند^[۱۴]. آثار تعییرات تولید مثلی در ماهیان در بسیاری موارد به شکل بروز تعییرات رفتاری و تعییرات بدنی است. از آنجاییکه چنین تعییراتی طبیعتاً ناشی از تعییرات درونی و فیزیولوژیک بدنی هستند بنابراین بررسی فاکتورهای سرمی می‌تواند نقش مهمی در شناخت این تعییرات فیزیولوژیک داشته باشد. چنین تعییراتی با شدت و ضعف در هر دو جنس نر و ماده دیده می‌شوند. اگرچه اساساً به دلیل تفاوت‌های هورمونی و نقش متفاوت تولید مثل میزان فاکتورهای سرمی در دو جنس متفاوت است^[۱۵-۱۶]. لذا در این تحقیق نیز میزان شاخصهای خونشناسی و برخی فاکتورهای بیوشیمیابی و هورمونی سرم خون مولدین نر و ماده ماهی کپوردریابی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

برای انجام این تحقیق همزمان با فصل تکثیر تعداد ۱۴ عدد ماهی کپور دریابی نر بالغ و ۱۴ عدد ماده ماده بالغ در بهار سال ۱۳۹۹ در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیچوال در بندترکمن استان گلستان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور ماهیان مولد صید شده توسط شرکتهای تعاونی صیادی پره استان گلستان توسط ماشینهای حمل ماهی مجهز به کپسول اکسیژن به کارگاه تکثیر انتقال داده شدند. پس از آن ماهیان نر و ماده به صورت جداگانه در دو ونیرو (تانک پرورشی بزرگ) قرار داده شده و برای سازگار شدن با شرایط جدید و از بین بردن استرس چند روزی نگهداری شدند. ماهیان نر مورد بررسی با سن $۳/۰۷\pm ۰/۲۶$ ، وزن متوسط $۱۳۰/۷/۸۵\pm ۱۶۹/۵۷$ گرم و طول متوسط $۵۳/۴۷\pm ۴/۹۷$ سانتیمتر و ماهیان ماده مورد بررسی با سن $۳/۷۱\pm ۰/۷۲$ ، وزن متوسط $۱۸۲/۷/۲۱\pm ۴۱۳/۸۰$ گرم و طول متوسط $۴۸/۹۴\pm ۴/۱۸$ سانتیمتر بودند. برای خونگیری از ماهیان ابتدا بیهوش کردن ماهیان با پودر گل میخک به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر انجام و سپس خونگیری از ماهیان از سرخرگ ساقه دمی با استفاده از سرنگ ۵ میلی‌لیتری انجام پذیرفت. پس از قرار دادن نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایشگاهی مخصوص بالاچاله در محفظ حاوی بین قرار داده شدند. در ادامه لوله‌های حاوی خون جهت آنالیز فاکتورهای خونشناسی از قبیل گلوبولهای سفید (WBC)، گلوبولهای قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلbul قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلbul (MCH)، غلظت متوسط هموگلوبین گلbulهای قرمز (MCHC) و نیز جداسازی سرم برای بررسی فاکتورهای بیوشیمیابی سرم خون از قبیل میزان گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، توتال پروتئین، آلبومین، کلسیم، سدیم، پتاسیم و هورمون کورتیزول در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیابی سرم خون ابتدا نمونه‌ها در دستگاه سانتریفیوژ با ۵۰۰۰ دور در مدت ۵ دقیقه، جداسازی شده و مقادیر هر کدام از فاکتورها به وسیله دستگاه اتوانالیزر تعیین گردید. در پایان تمامی داده‌های جمع آوری شده و کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۶ و جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel ۲۰۱۰ استفاده شد.

نتایج

نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای خونشناصی در جدول ۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج مشخص گردید که از لحاظ تعداد گلوبولهای قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلوبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولی (MCH)، میزان غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولهای سفید (WBC)، مونوسیت و گرانولوسم اختلاف معنی دار آماری در دو جنس نر و ماده وجود ندارد ($P > 0.05$).

جدول ۱- مقایسه میانگین شاخصهای خونشناصی مولدین نر و ماده ماهی کپور دریایی، حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف، نشان دهنده اختلاف بین ماهیان است ($p < 0.05$).

فاکتورهای خونشناصی / جنس	نر	ماده
(گرم در دسی لیتر) Hb	$118/37 \pm 1/45^a$	$119/53 \pm 1/44^a$
(گرم در دسی لیتر) Hb	$13/62 \pm 1/57^a$	$11/84 \pm 0/82^a$
(درصد) HCT	$28/2 \pm 6/14^a$	$37 \pm 1/20^a$
(فمتولیتر) MCV	$166/48 \pm 12/31^a$	$170/66 \pm 10/96^a$
(پیکوگرم) MCH	$75/45 \pm 7/27^a$	$74/2 \pm 2/38^a$
(گرم در دسی لیتر) MCHC	$44/36 \pm 4/31^a$	$43/62 \pm 1/93^a$
($10^3 / m^3$) WBC	$17/15 \pm 0/57^a$	$17/17 \pm 0/35^a$
مونوسیت (درصد)	$67/91 \pm 10/97^a$	$73/77 \pm 7/74^a$
گرانولوسم (درصد)	$32/07 \pm 10/97^a$	$33/24 \pm 15/57^a$

نتایج حاصل از این مطالعه در مورد فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی سرم مولدین ماهی کپور دریایی در جدول ۲ نشان داده شده است. بر اساس نتایج مشخص گردید که از لحاظ برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون از قبیل میزان گلوکز، کلسترول، کلسیم و کورتیزول در بین دو جنس نر و ماده کپوردریایی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوریکه میزان گلوکز و کلسترول در جنس نر و میزان کلسیم و کورتیزول در جنس ماده بیشتر بود. ضمن اینکه از لحاظ مقدار تری گلیسرید، توتال پروتئین، آلبومین، سدیم و پتاسیم در بین دو جنس نر و ماده کپوردریایی اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد ($P > 0.05$).

جدول ۲- مقایسه میانگین بخش فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی مولدین نر و ماده ماهی کپور دریایی، حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف، نشان دهنده اختلاف بین ماهیان است ($p < 0.05$).

فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمون / جنس	نر	ماده
(mg/dl) گلوکز	$128/71 \pm 16/85^a$	$105 \pm 16/02^b$
(mg/dl) تری گلیسرید	$118/92 \pm 53/35^a$	$139/21 \pm 29/87^a$
(mg/dl) کلسترول	$256/42 \pm 60/45^a$	$181 \pm 33/50^b$
(mg/dl) پروتئین کل	$3/67 \pm 0/15^a$	$3/47 \pm 0/39^a$
(g/dl) آلبومین	$1/83 \pm 0/48^a$	$1/56 \pm 0/28^a$
(mg/dl) کلسیم	$5/56 \pm 0/96^b$	$16/02 \pm 5/23^a$
(MEQ/L) سدیم	$144/71 \pm 5/51^a$	$141/35 \pm 6/40^a$
(MEQ/L) پتاسیم	$0/37 \pm 0/19^a$	$0/51 \pm 0/26^a$
(μg/dl) کورتیزول	$15/41 \pm 3/61^b$	$19/57 \pm 2/83^a$

بحث

فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه‌های مختلف با هم تفاوت دارند و ارتباط وابستگی زیادی با شرایط محیطی، تنفسی‌های، سن و غیره دارند^[۱۷] که یکی از این فاکتورها جنسیت ماهی می‌باشد. بنابراین باید برای هر گونه ماهی در شرایط متفاوت زیستی و فیزیولوژی، مقادیر طبیعی این فاکتورها وجود داشته باشد^[۱۸]. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از لحاظ تعداد گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکربت، حجم متوسط گلوبول قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولی، میزان غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولهای قرمز، تعداد گلوبولهای سفید، مونوسیت و گرانولیست اختلاف معنی‌دار آماری در دو جنس نر و ماده وجود ندارد ($P > 0.05$). اما میزان گلوکز و کلسترول در جنس نر و میزان کلسیم و کورتیزول در جنس ماده بیشتر بود. ضمن اینکه از لحاظ مقدار تری‌گلیسرید، توتال پروتئین، آلبومین، سدیم و پتاسیم در بین دو جنس نر و ماده کپوردریایی اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد ($P > 0.05$). در مطالعه‌ای بررسی فاکتورهای خونی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بهجه ماهیان کپور دریایی نشان داد میانگین و انحراف معیار تعداد گلوبولهای سفید برابر $7616 \pm 6782 / 68$ میلیمترمکعب، تعداد گلوبولهای قرمز برابر $44 \pm 25 / 6$ میلیون در میلیمتر مکعب، هموگلوبین برابر $9 / 15 \pm 1$ گرم در دسی لیتر، هماتوکربت برابر $24 / 25 \pm 2 / 9$ درصد، MCV برابر $938 \pm 0 / 16$ میلیون در میلیمتر مکعب، MCH برابر $260 / 75 \pm 25 / 34$ فمتولیتر، MCHC برابر $98 / 51 \pm 9 / 76$ پیکوگرم و MCV برابر $37 / 78 \pm 0 / 95$ درصد می‌باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار مقدار گلوکز برابر $124 \pm 12 / 53$ میلی‌گرم در دسی لیتر، کلسیم برابر $8 / 2 \pm 0 / 46$ میلی‌گرم در دسی لیتر، کلسترول برابر $163 \pm 74 / 28$ میلی‌گرم در دسی لیتر، تری‌گلیسرید برابر $262 / 67 \pm 23 / 03$ میلی‌گرم در دسی لیتر، پروتئین کل برابر $2 / 73 \pm 0 / 48$ میلی‌گرم در دسی لیتر، فسفر برابر $16 / 4 \pm 0 / 74$ میلی‌گرم در دسی لیتر، آهن برابر $59 / 5 \pm 35 / 07$ میکروگرم در دسی لیتر، آلبومین برابر $1 / 82 \pm 0 / 05$ گرم در دسی لیتر، سدیم برابر $127 / 17 \pm 3 / 6$ میلی‌اکی‌والان در لیتر، پتاسیم برابر $6 / 87 \pm 0 / 7$ میلی‌اکی‌والان در لیتر و کورتیزول برابر $9 / 8 \pm 1 / 95$ نانوگرم در میلی‌لیتر می‌باشد^[۱۹] که مقابله آن و بررسی مطالعاتی که توسط برخی محققین دیگر^[۲۰-۲۲] انجام پذیرفت با نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که میزان گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکربت، MCHC، تعداد گلوبولهای سفید، گلوکز، کلسترول، پروتئین کل، سدیم، کلسیم و کورتیزول در بالغین کپوردریایی افزایش و تری‌گلیسرید و پتاسیم کاهش می‌یابد. تعداد گلوبولهای قرمز در خون بر اساس گونه، سن، فصل و شرایط زیست محیطی، سلامت و غیره متفاوت است. تعداد آنها در فصل تخم ریزی بیشتر می‌شود^[۲۳]. در بررسی تغییرات انдрوزنیک برخی شاخصهای خون ماهی نر قزل آلای رنگین‌کمان در فصل تکثیر میزان هموگلوبین در بلوغ افزایش یافت^[۱۶] که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. شمارش گلوبولهای سفید و شمارش افتراقی گلوبولهای سفید اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت سلامت ماهی قرار می‌دهد^[۲۴]. از جمله عوامل موثر در تعداد گلوبولهای سفید می‌توان به عواملی چون استرس، سن، جنس و تغییر در میزان هورمون‌ها اشاره کرد^[۲۵-۲۷]. نتایج تحقیق جاری و مقایسه آن با مطالعات محققین دیگر نشان داد که میزان گلوبولهای سفید ماهی کپور دریایی نر و ماده در زمان بلوغ بیشتر است.

مطالعات نشان داده است با افزایش سن در ماهیان میزان گلوکز، کلسترول، سدیم، پتاسیم و پروتئین کل سرم خون افزایش می‌یابد. همچنین پروتئین کل در ماهیان انگشت قد، کمر از ماهیان بزرگتر می‌باشد و همزمان با رشد میزان پروتئین کل سرم خون افزایش می‌یابد^[۲۴] که بررسی نتایج تحقیق حاضر نیز این موضوع را نشان می‌دهد. علاوه بر این میزان پروتئین کل پلاسمای خون در گونه‌هایی از ماهیان که دارای فعالیت زیاد هستند بیشتر از ماهیان با فعالیت اندک است^[۲۵] که به نظر می‌رسد افزایش فعالیت مولدها در ماهیان مولد کپور دریایی نسبت به بهجه ماهیان می‌تواند دلیل آن باشد. بررسی وضعیت برخی از شاخصهای خونی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان نشان داد مقادیر کلسترول، سدیم و کلسیم با افزایش سن افزایش می‌یابد^[۲۶]. با افزایش سن میزان پروتئین در ماهی قزل آلای رنگین‌کمان نیز افزایش می‌یابد^[۲۷]. همچنین با افزایش سن روند افزایشی در مقدار پروتئین کپور معمولی^[۲۸] و کپور سرگنده^[۲۹] مشاهده گردید که با تحقیق حاضر مطابقت دارد.

نتایج بررسیهای خون شناسی در گونه‌های مختلف ماهیان نشان داد که مقادیر این فاکتورها در گونه‌های مختلف ماهی و حتی در دو جنس نر و ماده متفاوت است^[۴]. در برخی از مطالعات مقادیر شاخصهای خونشناسی در جنس نر بیشتر از ماده بوده است. مقایسه برخی از پارامترهای خون

در مولдин ماهی قوه برون نر و ماده در شرایط تکثیر نشان داد که گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، گلوبول سفید، درصد لنفوسمیت، در جنس نر بیشتر از ماده و مونوسیت جنس ماده بیشتر از نر بود که می‌تواند به علت متاپولیسم و فعالیت بیشتر ماهی نر نسبت ماده باشد [۳۰]. همچنین تعداد گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت در چالباش نر بیشتر از ماده بود [۳۱، ۳۷]. میزان گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت در ماهی قزل آلای رنگین کمان نر [۳۲، ۳۰]. کپور ماهیان نر بیشتر از ماده بود [۳۲، ۳۰]. در یک بررسی میزان گلوبولهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت در ماهی قزل آلای رنگین کمان نر [۳۳، ۳۰]. بیشتر از ماده بود که نتایج ذکر شده فوق با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. در این بررسی نتایج مقایسه شاخصهای خونی در مولдин نر و ماده کپور دریایی نشان داد که از لحاظ تعداد گلوبولهای قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلوبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلوبولی (MCH)، میزان غلظت متوسط هموگلوبین (MCHC)، تعداد گلوبولهای سفید (WBC)، مونوسیت و گرانولیست اختلاف معنی‌دار آماری در دو جنس نر و ماده وجود ندارد ($P > 0.05$). اندازه‌گیری الکتروولیتها می‌تواند نشان دهنده وضعیت ماهی مولد از نظر تعادل اسمزی باشد. بنابراین بررسی فاکتورهای سرمی می‌تواند نقش مهمی در شناخت تغییرات فیزیولوژیک داشته باشد [۱۶، ۱۵]. بر اساس نتایج تحقیق جاری مشخص گردید که از لحاظ برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون از قبیل میزان گلوکز، کلسترول، کلسیم و هورمون کورتیزول در بین دو جنس نر و ماده کپوردریایی اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد ($P < 0.05$). بطوريکه میزان گلوکز و کلسترول در جنس نر و میزان کلسیم و کورتیزول در جنس ماده بیشتر بود. ضمن اینکه از لحاظ مقدار تری‌گلیسرید، توتال پروتئین، آلبومین، سدیم و پتاسیم در بین دو جنس نر و ماده کپوردریایی اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد ($P > 0.05$). بررسی سرم خون ماهی مولдин قوه برون (*Acipenser persicus*) در دو جنس نر و ماده نشان داد میزان گلوکز، کلسترول و کلسیم در جنس نر بیشتر از ماده است [۳۵، ۳۴] که نتایج گلوکز و کلسترول با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. سطوح مختلف اجزای پلاسما به عنوان شاخصی در ارزیابی سلامت و وضعیت فیزیولوژیک ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلسترول در ساختمان غشای سلولی همراه فسفولیپیدها شرکت دارد. میزان کلسترول در بدن نسبت به سن و جنس و حالات مختلف فیزیولوژی تغییر می‌کند [۳۶] که در تحقیق جاری نیز میزان آن در مولдин کپور دریایی بیشتر بوده است. کلسترول ماده پیش ساز همه هورمونهای استروئیدی است. وقتی بر اثر استرس کورتیزول افزایش می‌یابد در واقع مقادیر زیادی از کلسترول صرف ساخت کورتیزول گردیده است [۲۱]. در این تحقیق میزان کلسترول در جنس نر و کورتیزول در جنس ماده بیشتر بود که به نظر می‌رسد به دلیل استفاده کلسترول و مصرف شدن آن در سنتر کورتیزول مقدار آن در سرم خون جنس ماده کمتر از نر بوده است. کلسیم فراواترین عنصر معدنی در بدن است [۲۱]. یون کلسیم موجود در پلاسمای خون ماهیان ماده، به عنوان شاخصی مطلوب برای پی بردن به زمان مناسب و قطعی رسیدگی جنسی مولдин محسوب می‌شود، چراکه در ماههای قبل از آغاز فصل تولید مثلی، مقادیر این یون در پلاسمای خون رفته رفته افزایش می‌یابد، تا به اوج مقدار خود در زمان یک تا دو ماه پیش از آغاز فصل تکثیر برسد [۳۷، ۳۵] که در تحقیق جاری نیز میزان آن در مولдин کپور دریایی بیشتر بوده است. همچنین میزان کلسیم در جنس ماده بیشتر از نر بود. با بررسی و مطالعه تحقیقات قبلی نتوانستیم دلیلی برای این امر پیدا کنیم که به نظر می‌رسد نیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه است. گلوکز به عنوان یکی از شاخصهای مهم در تعیین وضعیت فیزیولوژیک ماهی به کار می‌رود [۲۱]. نوسان فاکتورهای بیوشیمیایی خون از جمله تغییر سطوح گلوکز به عنوان شاخصهای بیولوژیک که تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر صید، دستکاری، حمل و نقل، نگهداری، تراکم بالا، خواص فیزیکی و شیمیایی آب و غیره قرار می‌گیرند، دارای اهمیت بسزایی می‌باشد [۲۸]. گلوکز خون متغیرترین پارامتری است که به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر استرس، دستکاری و حمل، استرس محیطی، تغییرات فصلی و وضعیت تنفسی و بلوغ می‌باشد [۳۹]. از انجاییکه تحقیق حاضر همزمان با بلوغ و زمان مهاجرت ماهی کپور دریایی مورد بررسی قرار گرفته نتایج تحقیق جاری و مقایسه با نتایج مطالعات قبلی نشان می‌دهد میزان گلوکز در مولдин ماهی کپور دریایی در زمان تولید مثل و مولдин افزایش می‌یابد. همچنین این افزایش گلوکز در دو جنس متفاوت بوده است به طوریکه میزان آن در جنس نر بیشتر از جنس ماده بود. در تحقیقی مشابه این تحقیق میزان گلوکز در ماهی قزل آلای نر در زمان تولید مثل به طور معنی داری افزایش یافت. افزایش گلوکز می‌تواند مربوط به فعالیتهای تولید مثلی و نیاز به انرژی ماهی و متعاقب آن آزاد شدن گلیکوژن کبد در خون باشد [۱۶] که در نتیجه انرژی لازم برای فعالیتهای فیزیولوژیکی ماهی در زمان بلوغ تامین می‌شود و دلیل دیگر نیز

می تواند با خاطر افزایش استرس ناشی از تولید مثل و در نتیجه افزایش کورتیزول باشد. تحقیقات مؤید این امر می باشد که کورتیزول نیز در ماهیان استخوانی بر عملکرد تولید مثل و رشد گامت اثر می گذارد. در شرایط استرس تغییراتی در میزان هورمون کورتیزول و قند خون اتفاق می افتد. هورمون کورتیزول در اثر استرسهای مختلفی که ممکن است به موجود زنده وارد شود تحریک شده و ترشح می گردد. تقریباً هر نوع استرسی (چه فیزیکی و چه عصبی) ظرف چند دقیقه منجر به افزایش شدید در ترشح کورتیزول از قشر فوق کلیوی می شود. یکی از آثار متعدد کورتیزول بالا بردن مقاومت بدن در هنگام استرس بوسیله کاهش جذب گلوکز می باشد^[۴۰] که می تواند دلیل افزایش میزان گلوکز در مولدین کپوردریایی باشد و در نتیجه با افزایش کورتیزول میزان گلوکز خون نیز سریعاً افزایش می یابد^[۱۶]. در تحقیق جاری نیز میزان کورتیزول در مولدین ماهی کپوردریایی در مقایسه با مطالعات دیگر افزایش یافت. مطالعات مشابهی مؤید افزایش سطح پلاسمایی هورمون کورتیزول همزمان با مهاجرت تولید مثل در ماهیان استخوانی است^[۱۶]. در تحقیقی مشخص گردید که سطح کورتیزول در طی فصل تخریزی در ماهی کپور معمولی افزایش می یابد^[۴۱] که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. در ماهی آزاد چینوک بالغ نیز کورتیزول افزایش یافت^[۴۲]. در یک مطالعه اعلان شد که افزایش کورتیزول در زمان تخریزی ماهی کلمه، ممکن است در ارتباط با فعالیتهای فیزیولوژیک ماهی مانند تنظیم اسمزی و فرآیندهای تأمین انرژی که همزمان با مهاجرت تولید مثلی در ماهی رخ می دهد^[۴۳] باشد. در بررسی دیگر افزایش غلظت پلاسمایی هورمون کورتیزول در ماهی کلمه ماده (*Rutilus*) مهاجرت تولید مثلی در زمان *rutilus caspicus*)، با نزدیک شدن به زمان تخریزی مشاهده شد که این کورتیزول را به زمان مهاجرت تولید مثلی و تنش وارد به ماهی نسبت دادند^[۴۴] که مطالعات ذکر شده با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، میانگین کورتیزول سرم خون در مولدین ماده کپوردریایی به صورت معنی داری بیشتر مولدین نر بوده است. در خصوص دلیل افزایش کورتیزول باید بیان نمود که این هورمون در زمان مهاجرت و تولید مثل میزان آن به طور طبیعی افزایش می یابد. هرچند صید، جابجایی، دستکاری و نقل و انتقال مولدها از محیط طبیعی (دریا) به مراکز تکثیر باعث افزایش میزان استرس و متعاقب آن افزایش کورتیزول می گردد^[۴۵] اما چون این عوامل در هر دو جنس نر و ماده تاثیری یکسان دارد شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می رسد مولدین ماده در زمان تولید مثل دارای حالات هیجانی و اضطراب بیشتری نسبت به مولدین نر می باشد.

نتیجه گیری

بررسی نتایج تحقیق جاری و مطالعات محققین دیگر نشان می دهد شرایط تقدیمهایی، محیطی، گونه ماهی، سن، جنسیت، زمان نمونه گیری، چگونگی تهیه نمونه، دقت و حساسیت روش های اندازه گیری از جمله فاکتورهایی هستند که می توانند عامل تفاوت در میزان فاکتورهای خونی ماهیان باشند^[۲۹]. نتایج حاصل از این تحقیق هم نشان می دهد که یکی از عوامل تاثیر گذار در تغییرات فاکتورهای خونی در ماهیان جنسیت می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که جنسیت ماهی کپوردریایی در زمان بلوغ بر شاخصهای خونشناصی ماهی تاثیری ندارد اما می تواند برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپوردریایی مانند کورتیزول، گلوکز، کلسیرون و کلسیم تاثیر گذار باشد.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای مهندس شکیبا ریاست محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیچوال در بندر ترکمن استان گلستان و جناب آقای مهندس عبدالجبار قزل که در انجام این بررسی نهایت همکاری و مساعدت را انجام دادند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

منابع

- 1- Vosoughi Gh, Mustajir B. Freshwater fish. University of Tehran Press. 1997; 317 p. [Persian]
- 2- Sattari M, Shahsavani D, Shafi'i Sh. Fisheries and Systematics 2. Hagh Shenas Press, 2004; 502 pp. [in Persian]
- 3- Harikrishnan R, Balasundaram C, He MS. Impact of plant products on innate and adaptive immune system of cultured finfish and shellfish. Aquaculture, 2011; 317: 1-15.
- 4- Mohammad Nejad Shamoushaki M, Hojati V. Study of hematology and some blood serum factors in Caspian carp, *Cyprinus carpio*. Journal of Animal Biology, 2014; 6(3):63-70. [Persian]
- 5- Mohammad Nejad M. Comparison of Blood Parameters and some Biochemical Factors and Blood Serum Enzyme Rainbow Trout Fed with Manual and Commercial (Pellet) Food Diet. Journal of Animal Physiology and Development, 2017; 39, 10(4): 69-79. [in Persian]
- 6- Shahsavani D. Determination of blood indices of sturgeon in south-east coast of Caspian Sea. Ph.D of Veterinary Medicine, 1998; pp: 76-7. [Persian]
- 7- Shirmohammadi H, Mohammad Nejad M, Alami Rostami Sh. The relationship between weight and changes in some of the hematologic and biochemical indices of silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). Journal of Animal Environment, 2020; 12(2): 233-238. [Persian]
- 8- Cnaani A, Tinman S, Avidar Y, Ron M, Hulata G. Comparative study of biochemical parameters in response to stress in Oreochomis aureus, O. mossambicus and two strains of *O. niloticus*. Aquaculture Research, 2004; 35: 1434–1440.
- 9- Kanieva NA. Changes in hematological indices of fish depending on the level of sublethal petroleum concentrations, in proceedings of the conference dedicated to the 105th anniversary of KaspNIRKh. Modern problems of the Caspian region (Astrakhan), 2002; pp: 130-132.
- 10- Mohammad Nejad Shamoushaki M, Ebrahimi KH, Farshadi R. The Effect of Feeding Frequency on Some Blood Serum Factors in the Common Carp (*Cyprinus carpio*). Journal of Animal Biology, 2011; 3(2): 55-62. [Persian]
- 11- Mohammad Nejad Shamoushaki M. Evalution of serum parameters in *Cyprinus carpio*, *Rutilus rutilus caspicus* and *Rutilus kutum* fingerlings. Iranian Journal of Biological Science, 2013; 8(1): 69-74. [Persian]
- 12- Mohammad Nejad Shamoushaki M. The detemination of some heamatological parameters and blood serum enzymes in *Cyprinus carpio*, Hypophthalmichthys molitrix and Ctenopharyngodon idella. Journal of Animal Physiology and Development, 2013; 21, 6(2):35-45. [Persian]
- 13- Mohammad Nejad Shamoushaki M, Ebrahimi Kh. Effect of starvation and compensatory growth on some blood serum biochemical factors in *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758). Iranian Journal of Biosciences, 2014; 6(4):93-100. [Persian]

- 14- Nespolo RF, Rosenmann M. Ntraspesific allometry of haematological parameters in *Basilichthys australis*. *Journal of fish Biology*, 2002; 60: 1358-1362.
- 15- Erdoúan O, Halüloúlu HU, Ciltas A. Annual Cycle of Serum gonadal steroids and serum lipids in *Capoeta capoeta umbla*, G.Idenstaedt, 1772 (Pisces:Cyprinidae). *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sicense*, 2002; 26: 1093-1096 .
- 16- Rafati H, Mirvaghefi A, Soltani M. The study of Anderogenic changes of some immunity parameters in *Oncorhynchus mykiss*. *Journal of Fisheries*, 2016; 68(4): 545-554. [Persian]
- 17- Shahsavani D, Mehri M, Taghvaei Moghadam E. Determination of concentration of some blood serum enzymes of *Huso huso*. *Journal of Veterinary Research*, 2007; 62(2): 127-129. [Persian]
- 18- Ross LG, Ross B. Anasthetic and Sedative techniques for aquatic animals, 2nd edn. Blackwell Science, Oxford, UK. 1999; 22, 57.
- 19- Asareh R, Mohammad Nejad Shamoushaki M, Faghani Langroodi H. Effect of starvation on some blood serum factors in *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758). *Journal of Animal Physiology and Development*, 2012; 20, 6(1):1-8. [Persian]
- 20- Imanpoor MR, Rohi Z, Sallaghi Z, Beikzadeh A, Davoodipor AR. Effect of Primalac probiotic on growth indices, blood biochemical parameters, survival and resistance to salinity stress in *Cyprinus carpio* fingerlings. *Fisheries Science and Technology*, 2015; 4 (3) :17-28. [Persian]
- 21- Kazemi R, Pourdehghani M, Yosefi Jourdehi MA, Yarmohammadi M, Nasri Tajan M. Cardiovascular system physiology of aquatic animals and applied techniques of fish haematology. Bazargan publications, 2010; pp, 194. [Persian]
- 22- Ahmadi K, Banaee M, Vosoghei AR, Mirvaghefi AR, Ataeimehr B. Evaluation of the immunomodulatory effects of silymarin extract (*Silybummarianum*) on some immune parameters of rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae). *ActaIchthyologica Pisca*, 2012; 42 (2): 113-120 .
- 23- Serajian Sh. Investigation and comparison of some blood factors and steroid hormones in immature and adult female Caspian gold mullet (*Liza auratus*). Student Thesis of Islamic Azad University, Lahijan Branch. 2006; 113 p. [Persian]
- 24- Sano T. Hematological studies of the culture fishes in Japan 3. Changes in blood constituents with growth of rainbow trout. *Journal of the Tokyo University of Fisheries*, 1969;46: 78-87.
- 25- Bromage N, Randall C, Davies B, Thrush M, Duston J, Carrillo M, Zanuy S. Photoperiodism and the control of reproduction and development in farmed fish. In: Lahlou, B., Vitiello, P. (Eds.), *Aquaculture: Fundamental and Applied Research*, Volume Coastal and Estuarine Studies 43. American Geophysical Union, Washington, DC, 1993; 81-102 pp .
- 26- Charoo SQ, Chalkoo SR, Qureshi TA. Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) blood profile alterations. *e-Journal of Science & Technology*, 2014; 2(9): 29-35.
- 27- Khajeh GH, Peyghan R. Evalution of some blood serum biochemical parameters of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) cultured in earthen ponds. *Journal of Veterinary Research*, 2007; 62(3):197-203. [Persian]

- 28- Baqizadeh A. The effect of age, sex and hormone injection on some cellular and biochemical parameters of common carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus 1758). M.Sc. thesis, Islamic Azad University, Lahijan Branch, 2011; 120 p. [Persian]
- 29- Heydari A. The effect of age, sex and hormone therapy on some cellular and biochemical parameters of blood at carp (*Aristichthys nobilis*). M.Sc. thesis, Islamic Azad University, Lahijan Branch, 2011; 162 p. [in Persian]
- 30- Saeedi AA, Moghimi SM, Ghiyasi M, Binaei M, Adel M. Comparison of some hematological parameters (blood) in sturgeon breeders (Qarabun) Males and females in terms of reproduction. Journal of Aquaculture Development, 2013; 7(1): 33-45. [Persian]
- 31- Fallahtkar B. Study of the relationship between blood factors and the quality of Russian sturgeon broodstocks (Chalbash) for artificial reproduction, Tarbiat Modares University, M.Sc. Student Thesis. 1198. [Persian]
- 32- Svobodova Z, Koroupova H, Modra M, Flajshans T, Randak Savina V, Cela D. Haematological profile of common carp spawners of various breeds. Journal of Applied Ichthology, 2007; 24: 55-59.
- 33- Rehulka J, Minarik B, Rehulkova E. Red blood cell indices of Rainbow trout *Onchohynchus mykiss* (Walbaum). Aquaculture, 2004; 101-108.
- 34- Shahsvani D, Mehrdad M, Mazandarani M. Determination of reference values of some non-electrolytes in the blood serum of *Acipenser persicus*, Journal of Pajouhesh-va-Sazandegi, 2006; 19(2): 48-51. [Persian]
- 35- Shahsvani D, Mehrdad M, Mazandarani M. Determination of serum electrolytes in *Acipenser persicus*. Iranian Veterinary Journal, 2006; 2(2): 112-117. [Persian]
- 36- Mohammadiha H. Clinical Biochemistry for Medical Laboratory Technologists, Tehran University Publications, Secound Edition, 1999; pp, 826. [Persian]
- 37- Pickering AD. The concept of biological stress. In: Pickering, A.D. Stress and Fish. Academic Press, London, 1981. 1-9 pp.
- 38- Bahmani M. Ecophysiological study of stress from H.P.I. and H.P.G. through its effect on the safety axis and reproductive process in Iranian sturgeon (*Acipenser persicus*). Doctoral dissertation of Islamic Azad University, Research Sciences Branch. 1999; 274 p. [in Persian]
- 39- Hosseini Fard SM, Ghobadi Sh, Khodabakhsh A, Razaghi Mansour M. The effect of different levels of soybean meals and avizyme enzyme supplement on hematological and biochemical parameters of serum in rainbow trout. Iranian Veterinary Journal, 2013; 9(3): 53-43. [in Persian]
- 40- Hafez Amini P, Oryan Sh, Parvar K. Evaluation of the effects of sodium chloride stress on blood sugar and cortisol in common carp. Iranian Scientific Fisheries Journal, 2003; 12(3): 35-42. [Persian]
- 41- Saha NR, Usami T, Suzuki Y. Seasonal changes in the immune activities of common carp (*Cyprinus carpio*). Fish Physiology and Biochemistry, 2003; 26: 379-387.
- 42- Maule A, Schrock R, Slater C, Fitzpatrick M, Schreck C. Immuno and endocrine responses of adult chinook salmon during freshwater immigration and sexual maturation. Fish & Shellfish Immunology, 1996; 6: 221- 233.

- 43- Suzuki HI, Agostinho AA, Winemiller KO. Relationship between oocyte morphology and reproductive strategy in loricariid catfishes of the Paraná River. Brazilian Journal of Fish Biology, 2000; 57(3): 791-807.
- 44- Akhondian M, Savari A, Salamat N, Movahdynya AA, Salari MA. Changes in plasma level of steroid hormones (Estradiol 17 β , 17 α 20 β Hydroxy Progesteron and Cortisol) and electrolytes, during different stages of reproductive cycle in *Rutilus rutilus caspicus* from Bandar Torkaman (South of Caspian Sea). Oceanography, 2015; 6 (21): 117-126. [Persian]
- 45- Odhiambo E, Angienda P, Okoth P, Onyango D. Stocking Density Induced Stress on Plasma Cortisol and Whole Blood Glucose Concentration in Nile Tilapia Fish (*Oreochromis niloticus*) of Lake Victoria, Kenya. International Journal of Zoology, 2020; 2:1-8.

Comparison of some hematological, biochemical and hormonal factors of blood serum in *Cyprinus carpio* broodstocks

Majid Mohammad Nejad^{1*}

1- Department of Fishery, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran.

ABSTRACT

Hematological and biochemical parameters are valuable indicators for monitoring fish health and physiological responses, nutritional status and environmental conditions affecting fish health. In this study, the comparison of hematological indices and some biochemical and hormonal factors of blood serum in male and female sea carp were investigated. For this purpose, blood samples were taken from two groups of male and female broodstock with 14 fish from each group. The results of this study on hematological factors showed that in terms of red blood cell (RBC), hematocrit (HCT), hemoglobin (HB), mean red blood cell volume (MCV), mean concentration of hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), white blood cell (WBC), monocyte (Mo) and granulocyte (Gr), there is no statistically significant difference between the two sexes ($P > 0.05$). The results of this study showed that there was a statistically significant difference between males and females in terms of glucose, cholesterol, calcium and cortisol ($P < 0.05$). The amount of glucose and cholesterol in males and the amount of calcium and cortisol in females were higher. There is no statistically significant difference between males and females in terms of triglyceride, total protein, albumin, sodium and potassium ($P > 0.05$). The results of this study show that sex in sea carp during maturity has no effect on the hematological parameters of fish but can affect some biochemical factors in the blood serum of carp such as glucose, cholesterol, calcium and cortisol.

KEYWORDS: Hematological factors, Cortisol, Common carp

ARTICLE TYPE

Original Research

ARTICLE HISTORY

Received: 21 December 2020

Accepted: June 2021

ePublished: 23 August 2021

* Corresponding Author:

Email address: majid_m_sh@bandargaziau.ac.ir

Tel: +(98) 1734360404

© Published by Tarbiat Modares University

eISSN:2476-6887 pISSN:2322-5513